

ДО

МИНИСТЕРСТВО ВА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОМИСИЯ ПО РЕДКИ БОЛЕСТИ

## СТАНОВИЩЕ

от

Проф. д-р Елисавета Наумова

Ръководител на Експертен център по Първични имунни дефицити

УМБАЛ” Александровска” София

Относно: Ваше запитване за възможностите за ваксиниране на пациенти с редки болести срещу COVID-19

Уважаеми проф. Стефанов,

Препоръките за ваксиниране на пациентите с Първични имунни дефицити (ПИД) срещу COVID-19 са съобразени със препоръките на пациентската организация за първични имунни дефицити (ИРОПИ) и европейското дружество за имунни дефицити (ESID).

Ваксинацията винаги е била част от превенцията на сериозни инфекции не само за обща популация, но и за пациенти с PID, особено в случая на настоящата пандемична обстановка. Понастоящем няма достатъчно валидирани данни за ефективността и безопасността на ваксините срещу COVID-19 в дългосрочен план при пациенти с ПИД. Въпреки това, въз основа на много добра поносимост и ефикасност в клиничните изпитвания при общата популация, общата препоръка е, че всички пациенти с PID трябва да бъдат ваксинирани (при условие, че не се използват живи атенюирани вирусни ваксини за тези, при които те биха били противопоказани), особено тези с известни рискови фактори за тежък COVID-19. Препоръчва се също техните близки контактни да бъдат ваксинирани. Очаква се ваксините които предизвикват главно антителин отговор да не са ефективни за пациенти с дефицит на антитела. При тях се разчита на ваксини, които предизвикват протективен Т-клетъчен отговор. Пациентите, които вече са преболедували COVID-19 могат да получат ваксина срещу COVID-19 най-рано 90 дни от преболедуването и след проверка на имунния отговор срещу SARS-CoV 2 преценен от наблюдаващия лекар-имунолог.

За да се избегне съвместна инфекция с грипния вирус и COVID-19, също се препоръчва всички пациенти с ПИД и техните близки да бъдат ваксинирани срещу сезонен грип само с инактивирани грипни ваксини.

Предвид липсата на проучвания за съвместно прилагане на ваксини, се препоръчва да се избягва съпътстваща ваксинация в рамките на 2 седмици от дозата на ваксината срещу COVID-19.

Ваксинацията срещу COVID-19 трябва да се извърши в различен ден от редовното инфузионно лечение с човешки имуноглобулинов препарат.

Всички пациенти с ПИД преди ваксинация трябва да се консултират със своя лекар експерт по ПИД, относно вида на ваксината, рисковите фактори, съпътстващата коморбидност и прилаганата съпътстваща терапия, които биха се отразили на ефекта от ваксиниране и евентуални усложнения.

15.09.2021

Гр. София

С уважение:

Проф. д-р. Елисавета Наумова, дмн